L'académie m'a chargé de lui faire le rapport de quatre observations que lui a envoyées mr Chévalier fils maitre en Chirurgie à La ferté milon.

dans la prémiere il est question d'un homme agé de 78 ans qui éprouva pour la prémiere fois en 1787 les symptomes de la pierre; quelque fois il en rendait de pétites par l'urètre; une d'elles s'arrêta dans la fosse naviculaire d'où elle ne put être rétirée qu'en faisant une incision sur cette partie: depuis cette époque arrivée en 1787 jusqu'en 1789, le malade se ressentit a peine de son incommodité. une nuit il fut reveillé par des douleurs inouies dans la vessie, le bésoin de rendre de l'urine etait extrême, et il ne pouvait y satisfaire: mr Chévalier fut appellé pour le secourir, la sonde introduite à la profondeur de trois pouces environ dans l'urètre lui fit connaitre l'existence d'une pierre dans ce canal: ce corps étranger ne put être déplacé et après quelques jours de souffrances le malade se determina enfin à se soumettre à une opération que son chirurgien lui avait déja proposée; la pierre qui fut extraite etait de la grosseur d'une aveline, elle etait enkistée et adhérente aux parois de l'urètre suivant le dire de mr Chévalier, cependant l'extraction s'en fit avec beaucoup de facilité, de pétites pierres sortirent par la playe et dans l'espace de dix jours la guérison fut complette.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 21 d.2 n°. 48

L'autheur de Cette observation a désiré fixer
l'attention de l'academie sur une pierre urinaire
enkistée dans l'urètre et adhérente aux parois de son
Kiste, C'est sous ce double rapport qu'il a cru qu'elle
pouvait être utile à l'art. nous ne porterons point sur
ces faits le même jugement que mr Chévalier, le
prétendu merveilleux qu'il y a trouvé disparait bientôt
quand on veut voir sans prévention; l'effet la dilatation
du tissu spongieux de l'urètre produite par la
présence de la pierre, aura formé ce que l'autheur
appelle un Kiste; on avait fait des tentatives avec
la sonde pour déplacer la pierre, un peu de sang et
de lymphe ~~[illegible]~~ se seront coagulés à la surface et
voila les adhérences, d'ailleurs mr Chévalier ne dit point
qu'elle était leur solidité, ni de quelle maniere elles
se faisoient, C'et de plus la pierre ne Siegait dans le
Canal de l'urètre que depuis ~~[illegible]~~ peu de jours.
j'Estime donc que sous quelque point de vue que l'on
Examine Cette observation elle n'offre rien d'interessant
pour les progrès de la Chirurgie.

La deuxième observation fait mention d'une fille qui parvint à l'age de 25 ans sans avoir éprouvé beaucoup d'incommodités du défaut absolu d'évacuations menstruelles. Elle se maria à cette époque et pendant les cinq années qui suivirent son mariage, tous les mois elle ressentait des coliques assez violentes que des saignées et des boissons appropriées à son état calmoient un peu de temps.
En avril 1790 mr Chevalier employa inutilement les moyens qui avoient tant de fois réussi: le bas ventre devint douloureux il sentit une tumeur considérable et dure à la région de la matrice et il pensa dès lors que cette tumeur étoit produite par un fluide épanché dans cet organe, à l'issue duquel il y avoit un obstacle, la malade devenue moins souffrante ne voulut point lui permettre de vérifier ses présomptions, par le toucher. Deux mois après ces accidents, de nouvelles douleurs se firent sentir avec violence, le ventre devint tendu et douloureux depuis la partie moyenne de la région hypogastrique jusqu'à l'ombilic; l'auteur de cette observation introduisit alors un doigt dans le vagin et appuyant en même tems une main sur le ventre, l'existence d'un fluide épanché dans la cavité de l'uterus ne lui parut plus équivoque. les douleurs devenant plus fortes il se décida à opérer de la manière suivante.
La patiente préalablement mise dans une position convenable il garnit d'une bandelette de linge jusqu'à un pouce environ de sa pointe, la lame d'un bistouri très long qui fut porté à plat, à l'aide du doigt indicateur, dans la scissure

du Col de la matrice; le doigt fut retiré, et le bistouri porté en avant fit une incision transversale d'une étendue qui parut suffisante à l'opérateur; aussitôt il sortit une grande quantité de sang fluide et vermeil, ce qui étonna beaucoup le Chirurgien, qui pour éviter la Cicatrisation des bords de la playe porta dans leur intervalle une tente mollette assujétie au dehors avec un fil; le sang coula pendant quelques jours; la diette, les fomentations émollientes calmerent les accidents; La malade a survécu à cette opération et jouit d'une bonne santé, mais la menstruation n'a pas eu lieu plus que de coutume.
Mr Chevalier ne pouvait mettre plus en évidence son peu de sçavoir et sa témérité. une femme parvient à l'age de 30 ans sans avoir été réglée et sans avoir éprouvé d'accidents bien facheux, une augmentation de douleurs et une tension du ventre qui ne cedent pas si promptement que de coutume, le font croire que la matrice est remplie du sang qui aurait dû s'écouler tous les mois par les évacuations menstruelles; plein de cette idée il compulse quelques Ecrivains célèbres, il trouve que Celse, paré et fabrice d'aquapendente ont parlé d'une membrâne qui peut s'opposer à la sortie du sang menstruel, et qui parfois se rencontre au Col même de l'uterus, dès lors il n'a plus de doute que cette derniere cause n'existe chez la femme qui fait le sujet de cette observation, la fluctuation du sang amassé dans la matrice n'est plus équivoque pour lui ~~[illegible]~~, et sans avoir rencontré un seul signe qui eut pu donner une apparence de réalité à ce que croyait voir son imagination en délire,

il se détermine de sang froid à plonger un instrument tranchant dans cet organe qui laisse aussitot sortir le sang des vaisseaux qui venoient d'etre ouverts et rien de plus.
Des accouchements contre nature, même des naturels, des observations particulières et en dernier lieu celles de MM Louvejal et Cultoli nous avoient appris que les plaies de la matrice distendue ~~de l'état pas~~ étoient peu dangereuses, cette observation tout en mettant au grand jour l'impéritie de son autheur qui a pratiqué une opération inutile et dangereuse, demontre aussi que les plaies de cet organe ~~l~~ en état de vacuité ne sont pas mortelles.

7e

Dans la troisieme observation mr Chevalier parle d'un officier d'un bon temperemment, qui après avoir lu dix gonorées, fut attaqué d'un flux dissenterique, accompagné des douleurs lancinantes dans le rectum, pour les quelles il consulta un Chirurgien qui lui annonça l'existence d'un ulcère dans cette partie, mr desault fut aussi consulté quelque tems après et y trouva une tumeur skirreuse, contre la quelle ~~[illegible]~~ il conseilla l'usage de meches imbibées de cerat, les quelles ne produisirent aucun soulagement : le malade avait toujours un flux de sang qui l'affoiblissait beaucoup, ce fut à cette epoque, en mai 1790 que mr Chevalier fut seul chargé du traitement de la maladie : après s'etre assuré de l'existence d'une tumeur squirreuse dans le rectum, il y porta sur elle des bougies fondantes et legerement caustiques ; le flux de sang devint moins abondant, mais le rectum s'affla, la difficulté d'uriner se fit sentir, et des crêtes et rhagades survinrent à la

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

marge de l'anus : le malade fut mis à l'usage des antivenériens qui dissiperent en peu de tems les differentes excroissances dont nous venons de parler, le bien être augmentait sensiblement ; Cependant l'employ Continué des Caustiques n'empechait pas le Carcinôme de prendre de l'accroissement le retrecissement de l'intestin permettait difficilement la sortie des excrements : alors un ecoulement blanchâtre se fit jour par l'urètre il survint à la verge et au scrotum une infiltration monstrueuse qui degenera en gangrène, Celle ci fut bornée par les anti-Septiques, quelque tems après les Cuisses et les jambes devinrent œdémateuses, la fievre s'alluma, les douleurs étoient vives et la faiblesse Extrême, les accidents augmenterent, Et le malade Epuisé succomba après une année de souffrances.

Son Cadavre fut ouvert ; la tumeur Carcinomateuse du rectum était de la grosseur d'un œuf de poule, sa Couleur était livide et foncée, elle occupait toute la Circonférence de l'intestin et tenait fortement à sa tunique interne dont elle paraissait être une vegetation, et ne laissait qu'une petite ouverture dans son milieu, à travers laquelle passoient les matieres fécales.

Cette observation ne peut être rangée parmi Celles qui peuvent diriger la Conduite de l'homme de l'art dans le traitement des maladies vénériennes ou Carcinomateuses ; depuis long tems on sait que le virus venerien se masque de mile manieres, et que l'irrégularité de sa marche ne permet pas toujours au praticien instruit de l'appercevoir partout ou il existe. une pratique Constante avait aussi

fon dans l'Erreur

appris que les Cancers du rectum sont incurables, et que Ceux la seroient de mauvaise foi qui prétendroient avoir guéri de Ces maladies, parcequ'apres avoir dilaté le rectum, le passage des matieres fécales se fesait avec plus de facilité, pendant quelque tems.

nous sommes loin d'approuver la Conduite de mr Chevalier dans le traitement qu'il a Employé, les Carcinômes du rectum sont des Ennemis Cruels qu'il faut flatter et Endormir, malheur à l'imprudent qui les stimule, leur réveil est terrible.

La derniere observation rappelle la maladie d'un Enfant Eminemment scrophuleux qui fut guéri par les moyens que l'art Conseille de mettre En usage En pareille occurrence.

De tout Ceque nous venons de dire, il résulte que l'autheur de Ces observations n'a rien fait pour les progrès de la Chirurgie dont il a souvent méconnu les principes. Et ma Conclusion est que l'académie ne lui doit aucun Eloge. gallée

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE